

การผ่าตัดเบ้าตา กรณีไหนบ้างที่ต้องผ่าตัดก่อนทำตาเทียม?



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การผ่าตัดเบ้าตา กรณีไหนบ้างที่ต้องผ่าตัดก่อนทำตาเทียม?

- ร่องตาหดหรือมีพังพืด
- เบ้าตาขุ่นมาก
- มีเปลือกตาล่างหย่อน
- ลูกตาเทียมทะลุเป็นต้น

- ตัวอย่าง การผ่าตัดแก้ไขผู้ป่วยร่องตาหด

ก่อนผ่าตัด



หลังผ่าตัด



098-984-7714
www.sirirajeyeprosthesis.com



ศูนย์บริการเทียม
โกลบอลศิริราช



ทิวศรศิริราช



SiOIPC
Siriraj Ocular Prosthetic Center

- ร่องตาหดหรือมีพังพืด
- เบ้าตาขุ่นมาก
- มีเปลือกตาล่างหย่อน
- ลูกตาเทียมทะลุ เป็นต้น

คลินิกเปิดให้บริการ ทุกวันพุธ เวลา 13:00 - 16:00 น. ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โถง 504 ศูนย์ตาเทียมห้อง 42
สอบถามเพิ่มเติมโทร 098-984-7714 (วันเวลาราชการ)