

มหาวิทยาลัยมหิดล
www.sirirajeyeprosthesisc.com

หากผู้ป่วยสวมใส่ตาปลอมเฉพาะบุคคล แล้วรู้สึกไม่พอดีกับร่องตา สามารถแก้ไขตาปลอมด้วยตนเองได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพราะอาจทำให้เบ้าตาอักเสบ เกิดขี้ตามาก เบ้าตาหรือร่องตาหด และไม่สามารถใส่ตาปลอมได้ในระยะยาว

หมายเหตุ: ควรปรึกษาแพทย์ หรือศูนย์ที่ทำตาปลอม และแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

098-984-7714
www.sirirajeyeprosthesisc.com

Facebook: sirirajeyeprosthesisc
Instagram: sirirajeyeprosthesisc

SiOPC
Siriraj Ocular Prosthetic Center

หากผู้ป่วยสวมใส่ตาปลอมเฉพาะบุคคลแล้วรู้สึกไม่พอดีกับร่องตาสามารถแก้ไขตาปลอมด้วยตนเองได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพราะอาจทำให้เบ้าตาอักเสบ เกิดขี้ตามาก เบ้าตาหรือร่องตาหด และไม่สามารถใส่ตาปลอมได้ในระยะยาว

หมายเหตุ: ควรปรึกษาแพทย์หรือศูนย์ที่ทำตาปลอม และแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น